

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1784 Tussilago farfara L. <i>Pas-d'âne</i>
- . Plante vivace de 1-2 dm, à tige cotonneuse, pourvue d'écailles, ovales-lancéolées, obtuses, apprimées, demi-embrassantes - feuilles se développant après les fleurs, toutes radicales, souvent très amples, pétiolées, suborbiculaires, cordées, sinuées-dentées, vertes en dessus, blanches ou grisâtres et tomenteuses en dessous - capitule dressé solitaire, terminant la tige, penchée après la floraison - fleurs jaunes à ligules de la circonférence dépassant les fleurs du centre.
Écologie Lieux frais dans toute la France, Corse.
Répartition Europe, Orient ; Afrique septentrionale.
Floraison Mars-avril. .
Usages L'infusion des capitules est tonique et stimulante.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <http://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : capitule simple Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <http://www.tela-botanica.org>



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pas-d'âne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Tussilage	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chou de vigne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fils-avant-le-père	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux pattes	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de saint Quirin	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pas-de-cheval	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pied-de-cheval	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Taconnet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Tussilage pas-d'âne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Ass's Foot			
eng	Clayweed			
eng	Colt's-foot			
eng	Coltsfoot			
eng	Coughwort			
deu	Eselsfuß			
spa	Farafara			
eng	Farfara			
ita	Farfara			
ita	Farfugio			
eng	Fieldhove			
deu	Gemeiner Huflattich			
eng	Horsehoof			
ndl	Klein Hoefblad			
spa	Pata de mula			
cat	Pota de caball			
eng	Son-before-father			
ita	Tossilaggine comune			
spa	Tusilago			
spa	Uña de caballo			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.


à
observée le **inconnue**
par

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]EYHERALDE Jean, PELTIER Francis - **Un journaliste chez les plantes : interview du Taconnet (Tiré du journal le Mont Blanc de juin 1968)** - 2004.03, p. 27- 30 - Départ./Région : 74, Nature et Patrimoine en Pays de Savoie, 1, N°12

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

Tussilago farfara L. [1753, Sp. Pl., 2 : 865]

Basionyme : Tussilago farfara L. [1753, Sp. Pl., 2 : 865]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 4.01 du « 15 mars 2017 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Tussilago	87366
Espèce	Tussilago farfara	70113

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Tussilago farfara* et code **1784**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Tussilago farfara* et code **2160**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Tussilago farfara* et code **3927**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Tussilago farfara* et page **0722** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Tussilago farfara* et code **0538** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 70113