

TABLEAU GÉNÉRAL

✱ Plante ayant des fleurs; on y trouve des étamines, un pistil ou les deux à la fois. ✱ Étamines et pistils sur la même plante, quelquefois dans des fleurs différentes. ✱ Fleurs réunies en capitule entouré d'une collerette de bractées. ✱ Fleurs réunies en capitule, c'est-à-dire serrées les unes contre les autres, sans pédoncules et placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige, entourées d'une collerette de bractées (involucre). [Exemples connus: ce qu'on nomme vulgairement la fleur du Bleuet, de la Marguerite, du Chardon sont, en réalité, des capitules de fleurs.] ✱ Toutes les fleurs sans pistil, ou toutes les fleurs sans étamines.	△ Fleurs à deux enveloppes (calice et corolle) de couleur et de consistance différentes. △ Fleurs à une seule enveloppe ou à deux enveloppes de couleur et de consistance semblables, ou sans enveloppe florale.	• Corolle non papilionacée. • Corolle papilionacée (fig. P, A, DE, CI) [c'est-à-dire irrégulière avec un pétale supérieur <i>e</i> (ééndard), deux pétales de côté <i>a, a</i> (ailes), et deux pétales inférieurs soudés <i>cc</i> (carène)]. □ Arbre ou arbuste résineux, à fleurs sans stigmate. □ Plante herbacée ou arbuste non résineux; fleurs à stigmates. — Feuilles à nervures non ramifiées [regarder par transparence] et parties semblables de la fleur disposées par 6 ou 3, ou moins de 3 — Plante n'ayant pas à la fois ces caractères; en général, feuilles à nervures plus ou moins ramifiées.	Section A: Plantes à pétales séparés → p. x. Section B: Plantes à pétales soudés entre eux → p. xv. Section C: Plantes à corolle papilionacée → p. xviii. Section II: Plantes gymnospermes → p. xxvi. Section E: Plantes monocotylédones → p. xxiii. Section D: Plante à une seule enveloppe florale → p. xviii. Section G: Plantes à fleurs en capitule → p. xxvi. Section F: Plantes t^{ies} sans étamines ou t^{ies} sans pistil → p. xxiv. Section I: Plantes cryptogames → p. xxvii.
---	--	--	--


Section A : PLANTES A PÉTALES SÉPARÉS. —

✱ Fleur ayant plus de 12 étamines ✱ Calice à sépales à la fois complètement séparés entre eux ou un peu soudés à la base et non soudés à l'ovaire [exemples: I, H, fleurs coupées en long par la moitié, S, AR]. ✱ Calice à sépales soudés plus ou moins longuement entre eux [exemples: N, SV, NF] — ou bien calice soudé à l'ovaire qui se trouve placé ainsi en apparence au-dessous de la fleur [exemples: A, G, C, E, fleurs coupées en long par la moitié].	1^{er} GROUPE → p. xi. 2^e GROUPE → p. xii. 3^e GROUPE → p. xii. 4^e GROUPE → p. xiv. 5^e GROUPE → p. xiv. 6^e GROUPE → p. xiv.	△ Pistil à carpelles entièrement libres ou réunis seulement par le milieu △ Pistil à carpelles soudés en un seul ovaire = Feuilles n^{es}, tant pas à la fois épaisses et charnues. • Arbre ou arbrisseau • Plante n'étant pas un arbre ou un arbrisseau
--	---	---



4^e GROUPE :

- ✱ Plante ayant à la fois un seul ovaire à deux loges, 10 étamines, 2 styles et 5 pétales..... *Saurifragées*, p. 113.
 ✱ Plante n'ayant pas à la fois ces caractères.
 - Feuilles opposées, au moins les inférieures.
 - ⊕ Étamines à anthères tournées en dehors; fleurs roses violettes ou pourpres; liges allongées..... *FRANKÉNIACÉES*, p. 40.
 - ⊕ Étamines à anthères tournées en dedans.
 - Fleurs peu visibles; groupées à l'extrémité des rameaux O, F..... *PORTULACÉES*, p. 107.
 - Fleurs très visibles; plante ne ressemblant pas aux figures O et F..... *Caryophyllées*, p. 41.
 - Feuilles toutes alternes; pistil composé de carpelles libres en même nombre que les pétales..... *Crassulacées*, p. 110.

5^e GROUPE :

- △ Arbrisseau grimpant ou rampant, à feuilles alternes.
 - * Fleurs non en ombelle; pétales verdâtres réunis par le haut;  plante grimpant par des vrilles..... *AMPÉLIDÉES*, p. 61.
 - * Fleurs en ombelle H; plante grimpant par des racines en crampons, ou rampant sur le sol..... *ARALIACÉES*, p. 136.
- ⊖ Feuilles divisées, au moins les inférieures.
 - △ Arbre ou arbrisseau non grimpant ni rampant.
 - Feuilles alternes
 - Feuilles non divisées en folioles distinctes; pétioles plus petits que les sépales [ex. : R, U]..... *GROSSULARIÉES*, p. 113.
 - Feuilles complètement divisées en 7 à 13 folioles COP;  5 étamines, 3 styles..... *Térébinthacées*, p. 65.
 - Feuilles opposées
 - + Arbre à fleurs irrégulières à 7 étamines H, rarement 5 à 6; feuilles opposées à folioles disposées en éventail..... *HIPPOCASTANÉES*, p. 61.
 - + Arbre, arbuste ou arbrisseau à fleurs régulières; feuilles à folioles non en éventail ST..... *STAPHYLÉACÉES*, p. 63.
- ⊖ Feuilles entières ou dentées.
 - ✕ Feuilles non opposées sauf parfois sur les jeunes rameaux.
 - ∩ Fleurs disposées en ombelle..... *Ombellifères*, p. 117.
 - ∩ Fleurs non disposées en ombelle.
 - ⊕ Étamines opposées aux pétales R..... *RHAMNÉES*, p. 64.
 - ⊕ Étamines alternes avec les pétales..... *TÉRÉBINTHACÉES*, p. 65.
 - ✕ Feuilles toutes ou la plupart opposées.
 - § Feuilles finement dentées EV.  à nervures écartées..... *CÉLASTRINÉES*, p. 63.
 - § Feuilles entières, à nervures se rapprochant au sommet CS. ou feuilles à nervures encore développées quand la plante est en fleur..... *CORNÉES*, p. 136.

6^e GROUPE :

- ✱ Fleurs en ombelle [exemples : DC, F, CY, SIM, R, FR, MA];        5 étamines; 2 styles SA..... *OMBELLIFÈRES*, p. 117.
- ✱ Plante aquatique submergée, à fleurs en verticilles [ex. : S].....  *LYTRIOPHYLLÉES*, p. 105.
- ✱ Plante n'ayant pas les caractères précédents (→ Voir la suite de l'analyse à la page suivante).

68. SANICULA. SANICLE. — (→ Voyez fig. SE, S, p. 118). Feuilles toutes ou presque toutes à la base, à lobes en coin. [Bois; fl. d'un blanc rosé. en général; 2-6 fl.; m.-j.; v.]

ARALIACÉES

HEDERA. LIERRE. — Arbrisseau à feuilles alternes, persistantes, luisantes, grimpant par des racines transformées en crampons; fleurs en ombelles; fruits noirs. [Rochers, bois; fl. d'un jaune verdâtre; longueur variable; s.-o.; v.]

CORNÉES

CORNUS. CORNOUILLER.

★ Fleurs paraissant *avant* les feuilles; fruits mûrs rouges;



fleurs en ombelle avec un involucre M. [Bois, haies; fl. jaunes; 5-50 d.; ms.-av.; v.]

★ Fleurs paraissant *après* les feuilles; fruits rouges, puis noirs;



fleurs en une sorte de grappe composée, sans involucre S. [Bois, haies; fl. blanches; 5-30 d.; m.-j.; v.]

Sanicula europæa L.

Sanicle d'Europe.

Assez commun, sauf dans la région méditerranéenne. [S]

Hedera Helix L.

Lierre grimpant.

Très commun. [S]

Cornus mas L.

Cornouiller mâle.

Assez rare. [S]


Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin.

Commun. [S]

LORANTHACÉES

○ Feuilles *développées*, à *nerfures saillantes*, plates, d'environ 5 à 10 c. de largeur; tiges en grandes touffes lâches V, VI.



1. **VISCUM** → p. 136.

GUI [1 esp.].

○ Feuilles *réduites* à de *petites écailles* d'environ 1 à 2 mm. de largeur; tiges en petites touffes très serrées AR.



2. **ARCEUTOBIUM** → p. 136.

ARCEUTOBE [1 esp.].

Viscum album L.

Gui blanc.

Commun; manque çà et là. [S]

Arceuthobium Oxycedri Bieb.

Arceute de l'Oxycedre.

Provence (rare).

2. **ARCEUTOBIUM. ARCEUTOBE.** — Feuilles épaisses, opposées, petites; tiges réunies en touffes très denses.


[Parasite sur le Genévrier; 2-10 c.; s.-o.; v.]

CAPRIFOLIACÉES

✱ Feuilles *simples entières* ou *dentées*.



Feuilles *arrondies et un peu dentelées* BO et tige rampante, ne dépassant pas 1 c. de diamètre.



5. **LINNÆA** → p. 138.

LINNÉE [1 esp.].



Feuilles *plus longues que larges* : Feuilles *dentées tout autour ou coriaces et luisantes*; fleurs à tube court.

: Feuilles *entières ou rarement à grands lobes arrondis, non coriaces*; fleurs à tube allongé.

3. **VIBURNUM** → p. 137.


VIBORNE [3 esp.].

4. **LONICERA** → p. 137.

LONICERE [8 esp.].

✱ Feuilles *composées de folioles distinctes*.

— Feuilles à 3 divisions; fleurs en tête globuleuse A.



— Feuilles à folioles nombreuses; fleurs pédunculées, en inflorescence rameuse.

1. **ADOXA** → p. 136.

ADOXA [1 esp.].

2. **SAMBUCUS** → p. 137.

SUREAU [3 esp.].

Adoxa Moschatellina L.

Adoxa Moschatellina (Herbe musquée).

Assez commun, sauf dans le Sud-Est et surtout le Midi. [S]

1. **ADOXA. ADOXA.** — (→ Voyez fig. A, ci-dessus). Feuilles de la base à long pétiole; filets des étamines divisés en deux jusqu'à la base; feuilles à divisions arrondies et terminées par une petite pointe; plante à odeur de musc.

[Endroits frais; fl. verdâtres: 8-13 c.; ms.-av.; v.]