

* Plante ayant des fleurs; on y trouve des étamines, un pistil ou les deux à la fois.

* Étamines et pistils sur la même plante, quelquefois dans des fleurs différentes.

* Fleurs réunies en capitule entouré d'une collerette de bractées.

* Fleurs réunies en capitule, c'est-à-dire serrées les unes contre les autres, sans pédoncules et placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige, entourées d'une collerette de bractées (involucre). [Exemples connus: ce qu'on nomme vulgairement la fleur du Bleuet, de la Marguerite, du Chardon sont, en réalité, des capitules de fleurs.]

* Toutes les fleurs sans pistil, ou toutes les fleurs sans étamines.

* Plantes sans fleurs, n'ayant jamais ni étamines, ni pistil.


* Fleur ayant plus de 12 étamines

* Calice à sépales a la fois complètement séparés entre eux ou un peu soudés à la base et non soudés à l'ovaire [exemples: I, H, fleurs coupées en long par la moitié, S, AR].

* Calice à sépales soudés plus ou moins longuement entre eux [exemples: N, SV, NF] — ou bien calice soudé à l'ovaire qui se trouve placé ainsi en apparence au-dessous de la fleur [exemples: A, G, C, E, fleurs coupées en long par la moitié].


TABLEAU GÉNÉRAL

• Corolle non papilionacée. • Corolle papilionacée (fig. P, A, DE, CI) [c'est-à-dire irrégulière avec un pétale supérieur <i>e</i> (ééndard), deux pétales de côté <i>a, a</i> (ailes), et deux pétales inférieurs soudés <i>ce</i> (carène)].	⊕ Pétales libres entre eux, jusqu'à leur base ⊕ Pétales soudés entre eux, au moins à la base.	Section A: Plantes à pétales séparés → p. x. Section B: Plantes à pétales soudés entre eux → p. xv. Section C: Plantes à corolle papilionacée → p. xviii. Section II: Plantes gymnospermes → p. xxvi. Section E: Plantes monocotylédones → p. xxiii. Section D: Plante à une seule enveloppe florale → p. xviii. Section G: Plantes à fleurs en capitule → p. xxvi. Section F: Plantes t^{ies} sans étamines ou t^{ies} sans pistil → p. xxiv. Section I: Plantes cryptogames → p. xxvii.
△ Fleurs à deux enveloppes (calice et corolle) de couleur et de consistance différentes. △ Fleurs à une seule enveloppe ou à deux enveloppes de couleur et de consistance semblables, ou sans enveloppe florale.	□ Arbre ou arbuste résineux, à fleurs sans stigmate. □ Plante herbacée ou arbuste non résineux; fleurs à stigmates.	Section III: Plantes à corolle papilionacée → p. xviii. Section II: Plantes gymnospermes → p. xxvi. Section E: Plantes monocotylédones → p. xxiii. Section D: Plante à une seule enveloppe florale → p. xviii. Section G: Plantes à fleurs en capitule → p. xxvi. Section F: Plantes t^{ies} sans étamines ou t^{ies} sans pistil → p. xxiv. Section I: Plantes cryptogames → p. xxvii.



— Feuilles à nervures non ramifiées [regarder par transparence] et parties semblables de la fleur disposées par 6 ou 3, ou moins de 3

— Plante n'ayant pas à la fois ces caractères; en général, feuilles à nervures plus ou moins ramifiées.



△ Pistil à carpelles entièrement libres ou réunis seulement par le milieu △ Pistil à carpelles soudés en un seul ovaire	1^{er} GROUPE → p. xi. 2^e GROUPE → p. xiii. 3^e GROUPE → p. xii. 4^e GROUPE → p. xiv. 5^e GROUPE → p. xiv. 6^e GROUPE → p. xiv.
= Feuilles épaisses et charnues = Feuilles n'étaient pas à la fois épaisses et charnues.	• Arbre ou arbrisseau • Plante n'étant pas un arbre ou un arbrisseau.

TABLEAU GÉNÉRAL. — SECTION A : PLANTES A PÉTALES SÉPARÉS

12^e GROUPE :

- * Fleurs à calice ou à corolle **membraneux**, disposées en épi serré ou en **capitule** entouré de bractées.

 * Styles **plus ou moins soudés**, 4 **stigmatés**; fleurs roses, lilacées, violettes ou blanches, en capitules avec une longue bractée renversée [ex.: MAR], ou fleurs en grappes plus ou moins serrées [ex.: CR, AR].

 * Ovaire **divisé en 4 parties** [regarder au fond du calice des fleurs passées].

 * 1 style **simple**; fleurs en capitule sans bractée renversée en dessous ou en épi serré.

 * Feuille **épaisse**, un peu charnue, 3 ou 5 styles; et fleurs **petites**, peu visibles O, F.

 * Ovaire **non divisé extérieurement en 4 parties**.

 * Plante **n'ayant pas à la fois les caractères précédents**.

 * Arbuste dressé ou grimpant.

 * Plante **herbacée** à feuilles opposées.

 * Fleurs **verdâtres**, en masse **globuleuse**.

 * Fleurs **colorées**.

 * Étamines **soudées par leur filets** en un tube plus ou moins long.

 * Étamines **attachées en face des pétales**.

 * Étamines **attachées entre les pétales**.

 * Style **prolongé au-delà du stigmate** qui est en anneau; fleurs bleues rarement blanches et tiges rampantes; 2 gros nectaires alternant avec les carpelles.

 * Feuilles **toutes à la base** RA, et plante couverte de longs poils roux.

 * Plante **n'ayant pas les caractères précédents**.

 * Étamines 4 dont 2 plus courtes; tige rampante à feuilles arrondies et pétiolées.

... **PLOMBAGINÉES**, p. 261.

 ... **PLANTAGINÉES**, p. 258.

 ... **Labiées**, p. 245.

 ... **Borraginées**, p. 219.

 ... **Portulacées**, p. 107.

 ... **CAPRIFOLIACÉES**, p. 136.

 ... **STYRACÉES**, p. 210.

 ... **ASCLÉPIADÉES**, p. 212.

 ... **PRIMULACÉES**, p. 205.

 ... **Plombaginées**, p. 261.



 ... **APOCYNÉES**, p. 212.

 ... **RAMONDIACÉES**, p. 218.

 ... **GENTIANÉES**, p. 213.

 ... **Caprifoliacées**, p. 136.

Section C : PLANTES A COROLLE PAPILIONACÉE

- | | | |
|--|--|---|
| <p>⊖ Arbre à fleurs roses paraissant avant les feuilles ; feuilles simples, rondes, échanquées à la base CS. </p> | | CÉSALPINIÉES, p. 92. |
| <p>⊖ Plante n'ayant pas ces caractères.</p> | | PAPILIONACÉES, p. 65. |
| <p>Section D : PLANTES A UNE SEULE ENVELOPPE FLORALE. —</p> | | |
| <p>⊖ Arbre, arbuste ou arbrisseau.</p> | <p>△ Plante grimpante.</p> | <p>13° GROUPE → p. XIX.</p> |
| | <p>△ Plante non grimpante.</p> | <p>14° GROUPE → p. XIX.</p> |
| <p>⊖ Plante n'étant ni un arbre, ni un arbuste, ni un arbrisseau ; parfois plante grasse très développée.</p> | <p>⊖ Feuilles ou bourgeons opposés.</p> | <p>15° GROUPE → p. XIX.</p> |
| | <p>⊖ Feuilles ou bourgeons non opposés.</p> | <p>16° GROUPE → p. XX.</p> |
| | <p>⊖ Une ou deux enveloppes florales (calice, ou calice et corolle).</p> | |
| | <p>⊖ Pas d'enveloppe florale.</p> | |
| | <p>★ Plante sans tiges ni feuilles constituées par des lames vertes flottant ordinairement sur l'eau.</p> | <p>17° GROUPE → p. XX.</p> |
| <p>★ Feuilles verticillées, au moins les inférieures.</p> | <p>★ Feuilles non développées réduites à des écailles ou plante à feuilles non développées parasite sur des branches d'arbres.</p> | |
| | | |
| | | |
| <p>★ Feuilles non verticillées et plante non parasite sur des branches.</p> | <p>⊖ Feuilles à stipules réunies au pétiole formant une gaine qui entoure plus ou moins la tige [ex. : H, T, AV, A].</p> | <p>   </p> |
| | <p>⊖ Feuilles sans stipules ou à stipules non réunies au pétiole, avec ou sans gaine.</p> | <p>18° GROUPE → p. XXI.</p> |
| | | <p>19° GROUPE → p. XXI.</p> |
| | | <p>20° GROUPE → p. XXI.</p> |

TÉRÉBINTHACÉES

- ☉ Fleurs sans pétales; feuilles composées (Voyez ci-dessous fig. L, T); fleurs staminées et fleurs pistillées sur des pieds différents.....1. **PISTACIA** → p. 65.
PISTACHIER [3 esp.].
 ☉ Fleurs à 5 pétales; feuilles simples ou composées; $\left\{ \begin{array}{l} + 5 \text{ étamines, fruits non ailés} \\ + 10 \text{ étamines, fruits munis d'une aile à chaque extrémité} \end{array} \right.$3. **RHUS** → p. 65.
SUMAC [2 esp.].
 ☉ Fleurs à 3-4 pétales; feuilles simples C;  fleurs ayant toutes à la fois étamines et pistil.....4. **AILANTUS** → p. 65.
AILANTE [1 esp.].
 2. **CNEORUM** → p. 65.
CAMELÉE [1 esp.].


1. PISTACIA. PISTACHIER. —


- △ Feuilles persistant pendant l'hiver, en général, sans foliole au sommet L;  pétiole bordé d'une aile verte de chaque côté; fruit presque sec, rouge, puis noir.
 [Endroits stériles; fl. verdâtres; 1-4 m.; av.-m.; v.]

- △ Feuilles ne persistant pas pendant l'hiver, ayant une foliole au sommet. $\left\{ \begin{array}{l} \times \text{ Feuilles les plus grandes ayant 7-11 folioles T;} \\ \times \text{ Feuilles les plus grandes ayant 1 à 7 folioles;} \end{array} \right.$ fruit de la grosseur d'un pois; feuilles luisantes presque coriaces, sans poils.
 [Endroits secs; rochers; fl. brunâtres; 2-6 m.; av.-m.; v.]
 [Cultivé; fl. brunâtres; 6-10 m.; m.-j.; v.]

2. **CNEORUM. CAMELÉE.** — (→ Voyez ci-dessus fig. C). Arbrisseau n'ayant pas en général plus de 1 m. de hauteur; feuilles beaucoup plus longues que larges, à bords enroulés en dessous; fruits d'un vert noirâtre.
 [Endroits arides; fl. jaunes; 1-10 d.; m.-jt.; v.]

3. RHUS. SUMAC. —

- ☞ Feuilles simples et entières COT;  feuilles sans poils, ovales, glauques; inflorescence devenant plumeuse CO.
 [Rochers, bois; fl. jaunâtres; 1-4 m.; j.-jt.; v.]

- ☞ Feuilles composées de 7 à 15 folioles dentées COR;  feuilles velues ainsi que les rameaux.
 [Coteaux secs; fl. d'un blanc verdâtre; 1-4 m.; j.-jt.; v.]

4. **AILANTUS. AILANTE.** — Arbre à feuilles de 4 à 5 d., composées de 25 à 31 folioles dentées; fruits d'abord verts, puis jaunes, d'un rouge plus ou moins vif. [Bords des chemins; fl. verdâtres; taille variable; m.-j.; v.]

Pistacia Lentiscus L.

Pistachier Lentisque

Région méditerranéenne.

Pistacia Terebinthus L.

Pistachier Térébinthe.

Midi, Sud-Est.

Pistacia vera L.

Pistachier vrai.

Région méditerranéenne (cultivé et spontané).

Cneorum tricoccum L.

Camélée à 3 coques.

Région méditerranéenne.

Rhus Cotinus L.

Sumac Fustet.

Région méditerranéenne. Sud-Est. [S]

Rhus coriaria L.

Sumac des corroyeurs.

Midi.

Ailantus glandulosa Desf.

Ailante glanduleux (Vernis du Japon).

Planté çà et là. [S]

PAPILIONACÉES

- ☐ Feuilles non terminées par une vrille ou par un filet. $\left\{ \begin{array}{l} \ominus \text{ Feuilles à 0, 1, 2 ou 3 folioles (sans compter les stipules, quand il y en a).} \\ \ominus \text{ Feuilles à plus de 3 folioles (sans compter les stipules).} \end{array} \right.$
- * Pas de stipules de moins de 3 mm. de longueur ou stipules transformées en épines. 1^{er} GROUPE → p. 65.
 * Stipules de plus de 3 mm. de longueur et non transformées en épines. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Stipules très différentes des folioles} \\ \text{Stipules assez semblables aux folioles} \end{array} \right.$
- 3^e GROUPE → p. 67.
 2^e GROUPE → p. 63.
 4^e GROUPE → p. 67.
 5^e GROUPE → p. 69.

3^e GROUPE :

- ⊙ Fleurs à *carène contournée sur elle-même* P ainsi que les étamines et le style;



plante grimpant par sa tige enroulée et par ses pétioles; stipules libres.....33. **PHASEOLUS** → p. 84.
HARICOT [1 esp.].

- ⊙ Fleurs à *corolle persistante, s'accroissant et devenant membraneuse après la floraison*; fruit ne dépassant pas ou dépassant à peine le calice; stipules soudées au pétiole; fleurs en capitule ou en grappe serrée.

- Carène en bec aigu au sommet [exemples : N, SU].



- × Toutes les étamines réunies ensemble par leurs filets : fruit droit et non divisé en parties successives; feuilles à 3 folioles, rarement simples...
× 9 étamines réunies ensemble par leurs filets, la 10^e étamine restant libre; fruit courbé sur lui-même et divisé en parties successives; feuilles simples.....

18. **TRIFOLIUM** → p. 77.
TRÈFLE [45 esp.].
12. **ONONIS** → p. 72.
ANONIS [13 esp.].

- Carène formée de 2 pétales libres plus grande que l'étendard AN;



étamines libres entre elles jusqu'à la base; arbuste à odeur fétide.....

38. **SCORPIURUS** → p. 90.
SCORPIURE [3 esp.].
1. **ANAGYRIS** → p. 69.
ANAGYRE [1 esp.].

= Calice à 3 dents d'un côté et à 2 divisions profondes de l'autre AR;




plante argentée soyeuse ainsi que les fruits.....

9. **ARGYROLOBE** → p. 71.
ARGYROLOBE [1 esp.].
15. **MEDICAGO** → p. 73.
LUZERNE [27 esp.].

- Carène obtuse au sommet, formée de 2 pétales soudés, plus courte que l'étendard.

= Calice à 5 divisions peu inégales.

- × Fruit plus ou moins enroulé sur lui-même, moins de 3 fois plus long que large [Voyez les figures, p. 73].
× Fruit droit ou peu courbé, au moins 3 fois plus long que large F, G.



16. **TRIGONELLA** → p. 76.
TRIGONELLE [6 esp.].

- × Fruit non courbé et moins de 3 fois plus long que large.

- Fleurs jaunes ou blanches, fleur en grappe allongée.....
18s
○ Fleurs violettes, en capitule entouré d'un involucre BI




17. **MELILOTUS** → p. 76.
MÉLILOT [9 esp.].

32. **PSORALEA** → p. 84.
PSORALÉE [1 esp.].

4^e GROUPE :

- △ Arbre à stipules transformées en épines RO; fleurs blanches, en grappe



29. **ROBINIA** → p. 84.
ROBINIER [1 esp.].

- △ Arbuste à fruits renflés en vessie C;



fleurs jaunes à calice couvert de poils noirs, à carène comme coupée au sommet.....
28. **COLUTEA** → p. 84.
BAGUENAUDIER [1 esp.].
→ Voyez 20. *Dorycnium*, p. 81.

- △ Arbrisseau ou plante herbacée n'ayant pas les caractères précédents.

- ⊕ Fleurs en capitule.
Feuilles à 5 folioles partant toutes du même point; fleurs blanches ou rosées, avec la carène bleuâtre → Voyez 20. *Dorycnium*, p. 81.
Feuilles à folioles ne partant pas toutes du même point.

- * Calice à 5 sépales séparés presque jusqu'à la base H; fleurs d'un jaune orange;



fruit courbé et aplati Y.



→ Voyez 14. *Hymenocarpus*, p. 73.

- * Calice à 5 dents.

- Fleurs de moins de 5 mm. en général; capitules portés sur des rameaux très allongés DO; stipules non soudées au pétiole; fleurs roses; 9 étamines réunies par leurs filets et 1 étamine libre.
— Fleurs de plus de 7 mm. en général; étamines toutes les 10 réunies par leurs filets.



19. **DORYCNOPSIS** → p. 80.
DORYCNOPSIS [1 esp.].

13. **ANTHYLLIS** → p. 73.
ANTHYLLIS [5 esp.].

⊕ Fleurs isolées par 1, 2 ou 5, ou en grappe ou en couronne (→ Voyez la suite à la page suivante).


18. TRIFOLIUM. TREFLE. —

⊕ Fleurs jaunes, parfois devenant brunes ou blanches, et dents du calice sans poils.

⊕ Fleurs roses, blanches, rosées ou jaunâtres (jamais à la fois jaunes et à dents du calice sans poils).

Série 1

△ Calice devenant très renflé, épaissi [exemples : RE, FR]



Série 1 → p. 77.


△ Calice et dents du calice sans poils. — Feuilles toutes à la base. — Feuilles le long de la tige.

Série 2 → p. 78.

Série 3 → p. 78.

Série 4 → p. 78.

△ Capitules très rapprochés des feuilles, qui les dépassent : capitules se trouvant en même temps au sommet des tiges et sur leurs côtés [exemples : BC, STR, SU, SV].




Série 5 → p. 79.

△ Calice jeune ayant au moins les dents ou le sommet du tube du calice velu.

△ Capitules non à la fois très rapprochés des feuilles et sur les côtés des tiges.

* Stipules à partie libre obtuse et dentée TI, STE.



Série 6 → p. 79.

○ Folioles très étroites et aiguës [exemple : AN];



capitules très allongés ; calice couvert de poils roux.

Série 8 → p. 80.

* Calice plus long que la corolle ou au moins égalant la corolle [exemples : A, CH, III, PAR].



Série 7 → p. 79.

* Stipules à partie libre aiguë.

○ Folioles non très étroites.

* Calice à 1 dent bien plus longue que les autres [exemples : ME, PR, RU].

* Calice plus court que la corolle.

* Calice à dents peu inégales.



Série 9 → p. 80.

Série 10 → p. 80.

Série 11 → p. 80.

□ Grappes de fleurs passées, ayant ordinairement plus de 1 c. de largeur ; fleurs devenant d'un brun foncé ; toutes les feuilles à 3 folioles attachées au même point.

= Folioles dentées vers le haut BA, feuilles supérieures souvent opposées ; tiges souterraines développées. (Parfois grappe très serrée, plus longue que large, lorsque les fleurs sont passées ; fleurs à pédoncule beaucoup plus court que le tube du calice : *T. spadicum* L.) [Prés : 1-3 d.; j.-at.; a.]



Trifolium badium Schreb.

Trèfle bai.

Montagnes (manque dans les Vosges).

[S]


□ Grappes des fleurs passées, ayant environ 1 c. ou moins de 1 c. de largeur, fleurs devenant d'un brun clair ou blanches.

○ Fleurs d'un jaune doré ; style presque de même longueur que le reste du fruit mûr. [Prés : 2-6 d.; j.-at.; a.] (Fig. P, PA.)

○ Fleur d'un jaune clair, style égalant au plus le quart du reste du fruit mûr TF

× Fleurs groupées par 20 ou plus ; étendard fortement strié et courbé en cuiller au sommet, en grappe d'environ 1 c. de largeur. [Champs : 2-5 c.; m.-n.; a.]

× Fleurs groupées par 2-16 ; étendard plié en long presque jusqu'au sommet ; fleurs en grappe d'environ 4-7 mm. de largeur. (Etendard tout à fait lisse, pédoncules des fleurs à peu près égaux aux tubes du calice : *T. micranthum* Viv. ; — étendard très finement strié, pédoncules des fleurs plus courts que le tube du calice : *T. minus* Rchb.) [Prés, sables ; 5-30 c.; m.-n.; a.]



Trifolium aureum Poll.

Trèfle doré

Montagnes, et çà et là. [S]

Trifolium patens Schreb.

Trèfle étalé.

Nord, Centre, Ouest, Midi. [S]

Trifolium campestre Schreb.

Trèfle des champs.

Commun. [S]

Trifolium filiforme L.

Trèfle filiforme.

Commun. [S]

Série 2

- Calice entourant le fruit, sans poils et à 5 dents presque égales SP;



feuilles supérieures opposées; folioles dentées tout autour. [Coteaux, endroits incultes; fl. rougeâtres; m.-j.; a.]

- Calice entourant le fruit, velu, et à dents inégales FR, RE, TO.

Dents du calice saillantes FR, RE.

- + Calice plus large au sommet FR;



bractées des fleurs inférieures presque égales au calice; capitules devenant globuleux F. [Près, chemins; fl. roses, rarement blanches; 1-4 d.; j.-o.; v.]



bractées des fleurs inférieures très petites, à peine distinctes; corolle dont l'étendard semble inférieur RES. (Parfois grappes ayant en général moins de 1 c. de longueur et fleurs à pédoncules distincts: *T. Clusii* G. G.)




[Près, chemins; fl. rouges, rarement blanches; 1-4 d.; m.-j.; a.] capitules tout le long de la plante, devenant globuleux et très velus; tiges et folioles sans poils ou presque sans poils. [Près, bois; fl. roses; 5-20 c.; av.-m.; a.]

Dents du calice cachées dans les poils TO;




Série 3

- ★ Folioles 5-7 fois plus longues que larges AL;



fleurs devenant renversées; calice à dents ayant environ 2 à 4 fois la longueur du reste du calice. [Pelouses, rochers; fl. rouges, rarement blanches; 10-15 c.; j.-at.; v.]

- ★ Folioles moins de 3 fois plus longues que larges TH;



fleurs toujours dressées; calice à dents égalant environ le reste du calice. [Prairies, rochers; fl. d'un blanc rosé; 5-10 c.; j.-at.; v.]

- ⊕ Grappes serrées, de moins de 1 c. de largeur, en général, fleurs de moins de 5 mm. de longueur.


= Grappe de fleurs sans pédoncule commun développé G;




feuilles d'un vert clair, à folioles dentées presque tout autour, [Près, chemins, champs; fl. rosées ou blanches; 1-4 d.; m.-j.; a.]

= Grappe de fleurs ayant un pédoncule commun développé.

- : Fleurs passées non renversées STR; stipules à dents glanduleuses;



stipules obovales ST; fruit ovale TS. [Près; fl. roses; 1-4 d.; m.-j.; a.]



- : Fleurs passées renversées PE; stipules sans dents glanduleuses;



stipules ayant une pointe au sommet PE. [Près, endroits incultes; fl. rosées; 10-20 c.; m.-j.; a.]

Série 4

- ⊕ Grappes serrées, de plus de 1 c. de largeur, en général, fleurs de plus de 5 mm. de longueur ou de plus de 5 mm.

△ Tiges à la fois rampantes et portant cà et là des racines adventives R;



folioles en cœur renversé, sans poils; stipules en pointe; fleurs passées renversées. [Près, chemins; fl. blanches ou rosées; 5-15 c.; m.-n.; v.]

- Calice à dents 2 à 5 fois plus longues que le reste du calice MI;



tiges dressées, creuses en dedans; stipules entières. (Parfois grappes de fleurs de moins de 1 c. de largeur sur un pédoncule commun ordinairement plus long que la feuille, étendard très aigu: *T. angulatum* DC.)

△ Tiges dressées ou couchées à la base, mais ne portant pas de racines adventives.

- Calice à dents égales au reste du calice ou plus courtes.

- × Fleurs roses ou rosées; dents du calice se rejoignant à leur base par un bord arrondi TE;



[Près; fl. rosées, rarement blanches; 2-5 d.; j.-jt.; a.] stipules terminées par une longue pointe E; fruit non bosselé TE; folioles dentées tout autour. (Parfois, fleurs d'abord blanchâtres, puis rosées: *T. hybridum* L.)



- Calice à dents les plus longues égalant environ le reste du calice ou plus courtes NI; [Près, chemins; 1-5 d.; m.-j.; a.]



- Calice à dents les plus longues, dépassant le reste du calice PA; [Rochers, près; 1-2 d.; j.-s.; v.]



Trifolium spumosum L.

Trèfle écumeur.

Région méditerranéenne (très rare et introduit).

Trifolium fragiferum L.

Trèfle porte-fraise.

Commun. [S]

Trifolium resupinatum L.

Trèfle renversé.

Midi, Ouest et çà et là. [S]

Trifolium tomentosum L.

Trèfle cotonneux.

Région méditerranéenne, Dépts des Basses-Pyrénées et de la Gironde.

Trifolium alpinum L. [S] sub.

Trèfle des Alpes.

Alpes, Pneu-cent Central, Pyrénées. [S]

Trifolium caespitosum Reyn.

Trèfle gazouillant.

Jura, Alpes, Pyrénées. [S]

Trifolium glomeratum L.

Trèfle aggloméré.

Ouest, Midi, manque dans les Vosges et le Jura, rare ailleurs.

Trifolium strictum W. et K.

Trèfle raide.

Centre, Ouest, Midi.

Trifolium Perreymondii Gren.

Trèfle de Perreymond.

Midi (rare), manque en Provence.

Trifolium repens L.

Trèfle rampant (Trèfle blanc).

Très commun. [S]

Trifolium Michelianum DC.

Trèfle de Micheli.

Centre, Ouest, Sud-Ouest. [S] sub.

Trifolium elegans Savi.

Trèfle élégant.

Assez rare (et introduit). [S]

Trifolium nigrescens Viv.

Trèfle noirissant.

Région méditerranéenne. [S] sub.

Trifolium pallescens Schreb.

Trèfle pâlisant.

Alpes de la Savoie et du Dauphiné, Auvergne. [S]