

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1647 Sambucus nigra L. Sureau noir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Arbrisseau ou arbuste de 2 à 6 mètres, à rameaux ligneux, verruqueux-grisâtres, remplis d'une moelle blanche, les jeunes brièvement hispides</li> <li>- feuilles à 5-7 folioles pétiolulées, ovales-acuminées, dentées</li> <li>- stipules nulles ou très petites</li> <li>- fleurs blanches, un peu jaunâtres par la dessiccation, très odorantes, disposées en large corymbe plan à 5 branches principales, paraissant après les feuilles</li> <li>- corolle à lobes ovales-arrondis</li> <li>- anthères jaunes</li> <li>- baies noires (rarement blanchâtres) à la maturité. Varie à folioles pennatiséquées, à lanières étroites (S. laciniata Mill.).</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Bois, haies, ruisseaux, dans presque toute la France et en Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Répartition</b> Europe ; Caucase et région pontique ; subspontané en Algérie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Floraison</b> FL juin <b>Fructification</b> septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Usages</b> Les fleurs sont employées en infusion comme sudorifiques ; l'écorce et les baies sont purgatives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

|                                                                                |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Microphanérophytes (8m) (caducifoliées)                      |                                                                                         |
| Formation végétale : microphanérophytaie                                       |                                                                                         |
| Chorologie : eurasiatique méridional                                           |                                                                                         |
| Inflorescence : cyme multipare<br>Fruit : drupe<br>Couleur de la fleur : blanc | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : endozoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Grand Sureau              | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Sureau noir               | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Arbre de Judas            | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Haut Bois                 | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Sambequier                | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Sambuquier                | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Sampéchier                | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Seuillet                  |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Seuillon                  |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Sus                       |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Suseau                    |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Susier                    | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Seus                      |                    | Peu usité et à éviter  |       |
| eng    | Alderne                   |                    |                        |       |
| deu    | Baumholunder              |                    |                        |       |
| eng    | Black Elder               |                    |                        |       |
| eng    | Bore-wood                 |                    |                        |       |
| eng    | Bourtree                  |                    |                        |       |
| eng    | Common Elder              |                    |                        |       |
| eng    | Elder                     |                    |                        |       |
| eng    | Elderberry                |                    |                        |       |
| eng    | European black Elderberry |                    |                        |       |
| eng    | European Elder            |                    |                        |       |
| deu    | Fliederbeere              |                    |                        |       |
| ndl    | Gewone Vlier              |                    |                        |       |
| deu    | Holder                    |                    |                        |       |
| deu    | Holunder                  |                    |                        |       |
| spa    | Sabuco                    |                    |                        |       |
| ita    | Sambuco comune            |                    |                        |       |
| ita    | Sambuco nero              |                    |                        |       |
| cat    | Saüc ver                  |                    |                        |       |
| spa    | Saúco                     |                    |                        |       |
| cat    | Saüquer                   |                    |                        |       |
| deu    | Schwarzer Holunder        |                    |                        |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

Usage :

Rédaction collaborative.

Les fruits bien murs peuvent être consommés en confiture. Attention, les fruits immatures sont vomitifs.  
Les tiges, vidées de leur moelle, sont utilisées par les enfants pour faire des pistolets à bouchon.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **1 juin 1859**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**


## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]ARNAL Claude - **Etude sur les pistils à ovaire infère. I Sambucus nigra.** - 1948, p. 60- 66 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 95 - Fascicule 1-2
- [Botanique]DES ETANGS S. - **Caractère qui sert à distinguer le Sambucus racemosa L. du S. nigra L.** - 1870, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 17 - Fascicule session

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Sambucus nigra L. [1753, Sp. Pl., 1 : 269]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

**Légende**  
 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Place du taxon dans la classification

| Rang                                                        | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Cladus                                                      | Plantae                          | 101140  |
| Cladus                                                      | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus                                                      | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus                                                      | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus                                                      | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus                                                      | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus                                                      | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus                                                      | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus                                                      | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus                                                      | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus                                                      | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus                                                      | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus                                                      | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre                                                       | Dipsacales                       | 102766  |
| Famille                                                     | Adoxaceae                        | 100951  |
| Genre                                                       | Sambucus                         | 87147   |
| Espèce                                                      | Sambucus nigra                   | 60241   |
| Plantes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété...) | Sambucus nigra 'Laciniata'       | 103029  |
| Plantes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété...) | Sambucus nigra 'Viridis'         | 103030  |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Sambucus nigra* et code **0983**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Sambucus nigra* et code **1647**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Sambucus nigra* et code **1969**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Sambucus nigra* et code **3633**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Sambucus nigra* f. *chlorocarpa* et page **0668** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Sambucus nigra* et code **0304** en tant que nom retenu
  - le nom de *Sambucus nigra* var. *decussata* et code **0304** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.