

· Fleur complète, ayant un calice, une corolle, des étamines et un pistil.

Corolle polypétale, composée de pétales libres se détachant séparément (Polypétales.)

Pétales et étamines insérés sur le réceptacle ou sur un disque hypogyne, sans adhérence avec le calice; ovaire libre ou supère. THALAMIFLORES I

## I. — THALAMIFLORES. . .

= Calice à 3-15 sépales ou divisions.

⊙ Étamines nombreuses, 12 et plus.

Feuilles simples ou composées, jamais entières; étamines nombreuses; carpelles libres ou soudés en capsule sèche.

(part.) RENONCULACÉES 1

### FAMILLE 1. — RENONCULACÉES.

Dessins de M<sup>me</sup> HERING

Fleurs régulières ou irrégulières; 3-15 sépales, souvent colorés; 3-15 pétales, parfois très petits ou nuls; étamines nombreuses, libres; carpelles à 1 graine et indéhiscent, ou à plusieurs graines et déhiscent, très rarement en forme de baie.

Fleurs solitaires, en grappe ou en panicule; feuilles simples ou composées, ordinairement alternes; herbes ou arbustes grimpants.

Environ 700 espèces répandues dans presque tout le globe.

#### Genre 1. — RANUNCULUS L. — Renoncule.

(*Rana*, grenouille, *colere*, habiter : plusieurs espèces sont aquatiques et servent de retraite aux grenouilles.)

5 sépales; 5 pétales ou plus, à onglet presque toujours muni d'une écaille ou d'une fossette nectarifère; carpelles non bossus à la base, mucronés ou terminés en bec court, disposés en têtes globuleuses ou oblongues.

Fleurs solitaires, jaunes ou blanches; feuilles alternes, rarement toutes radicales; plantes herbacées.

Environ 200 espèces croissant dans tout le globe.

#### — RENONCULACÉES —

+ Fleurs jaunes.

\* Feuilles diversement découpées.

Ⓛ Plantes annuelles; carpelles ridés, tuberculeux ou épineux.


Sépales réfléchis; souche renflée en bulbe arrondi, non stolonifère.

R. bulbosus 45

**45. — R. bulbosus L. *R. bulbeuse*** (Rave-de-Saint-Antoine). — Souche vivace, courte, *renflée en bulbe arrondi*, à racines fibreuses; tige de 20-60 cm., dressée ou ascendante, velue, ainsi que les feuilles; feuilles ovales dans leur pourtour, pennatiséquées, à 3 segments trilobés, incisés-dentés, le moyen plus longuement pétiolulé; pédoncules sillonnés; *sépales réfléchis*, velus; réceptacle velu; carpelles glabres, comprimés, fortement bordés, à *bec court, large, un peu arqué au sommet*.

Varie à souche non bulbiforme à fibres épaisses et longuement atténuées, à feuilles plus profondément divisées (*R. ALEÆ* Willk.; *R. NEAPOLITANUS* G. G. non Ten.).

Prés, pelouses, talus, champs, dans toute la France et en Corse. — Europe surtout centrale et septentrionale; Afrique septentrionale. = Avril-juillet. — Vénéneuse; nuisible aux prairies.



**Ranunculus bulbosus.**