



Nouvelle Aquitaine Activité Disparitions Ma précieuse en Nouvelle Aquitaine France

5 exemples issus de ce début de liste relatif à la Nouvelle Aquitaine

A	C	D	E	F	G	H
CD_REF Taxref 10	Famille	Nom valide retenu	Rang	CATEGORIE	CRITERES	ARGUMENTAIRE
80211	Ranunculaceae	Adonis aestivalis L., 1762	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
81197	Droseraceae	Aldrovanda vesiculosa L., 1753	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
83152	Poaceae	Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
84297	Rubiaceae	Asperula arvensis L., 1753	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
85999	Apiaceae	Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
87577	Brassicaceae	Camelina microcarpa Andr. ex DC., 1821	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
88576	Cyperaceae	Carex hordeistichos Vill., 1779	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
89637	Asteraceae	Centaurea maculosa Lam., 1785	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
92146	Colchicaceae	Colchicum longifolium Castagne, 1845	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
93620	Convolvulaceae	Cuscuta epilinum Weihe, 1824	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
94572	Ranunculaceae	Delphinium consolida L., 1753	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
94599	Ranunculaceae	Delphinium pubescens DC., 1815	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
94606	Ranunculaceae	Delphinium verdunense Balb., 1813	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
95847	Elatinaceae	Elatine alsinistrum L., 1753	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
96851	Cyperaceae	Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
96894	Geraniaceae	Erodium ciconium (L.) L'Hér., 1789	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
97183	Brassicaceae	Erysimum cheiranthoides L., 1753	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
97667	Euphorbiaceae	Euphorbia serrata L., 1753	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
100608	Orchidaceae	Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr., 1839	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
103478	Brassicaceae	Iberis pinnata L., 1755	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
105548	Lamiaceae	Leonurus cardiaca L., 1753	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
106351	Linaceae	Linum viscosum L., 1762	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.
106353	Orchidaceae	Liparis loeselii (L.) Rich., 1817	ES	RE		Taxon supposé disparu d'Aquitaine.

- 1) L'**adonis d'été** (*Adonis aestivalis* L.), localement appelé "goutte de sang" ou "œil de faisan"¹ est une espèce de plante herbacée annuelle de la famille des *Ranunculaceae*.

Adonis aestivalis L.



Adonis aestivalis

Picture taken by [BerndH](#) Date: 15. May 2004

Description de Coste

52 *Adonis aestivalis* L. *Adonis d'été*

- Racine annuelle, fibreuse
- tige de 20-40 cm, souvent simple, glabre ou pubescente à la base
- feuilles multifides
- fleurs rouges, rarement jaunes
- sépales appliqués contre les pétales, glabres
- pétales 5-10, oblongs, plans, étalés, égaux, d'un rouge clair ou jaune citron
- anthères d'un violet noir
- épi fructifère dense, oblong-cylindrique
- carpelles glabres, à bord supérieur muni à la base d'une dent aiguë, à bec droit, obliquement ascendant, concolore.

Écologie Moissons des terrains calcaires, dans toute la France, mais rare dans le midi.

Répartition Europe, excepté le nord ; Asie centrale et occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-Juillet.



[Voir +/Compléter](#)

Répartition

Observations



Taxons supérieurs

Ordre : Ranunculales

Famille : Ranunculaceae

Genre : *Adonis*

Nom retenu

☞ ***Adonis aestivalis* L.**

☞ Basionyme : *Adonis aestivalis* L.

Synonymes

☞ *Adonis aestivalis* var. *dentata* Coss.

☞ *Adonis bienertii* Nevski

☞ *Adonis ceretana* Sennen

2) Espèce liste rouge menacée

Asperula arvensis L., 1753¹

Asperula arvensis, l'aspérule des champs, est une espèce de plante herbacée dicotylédone de la famille des Rubiacées.,

Petite plante annuelle (8 à 25 cm) glabre, aux feuilles linéaires, verticillées par 6 à 9. Les fleurs visibles d'avril à juin, sont bleu vif, groupées en capitules².



Photo Hugues Tinguy

Statuts de protection et de conservation

Liste Rouge UICN de la Flore menacée de France :

- **EN** UICN(Fr) : En danger
Espèce encourrant un risque très élevé d'extinction dans la nature
Tendance d'évolution en France : **diminution**
Critères d'évaluation UICN : B2b(ii,iii,iv,v)c(iii,iv)

Protection et réglementation dans les Hautes-Alpes :

- Aucun statut particulier dans les Hautes-Alpes

Autres statuts : (Source INPN)

- **Protect./Régl. niveau régional : Espèces végétales en région Alsace**
Arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale / Article 1
Désignation dans le texte : *Asperula arvensis* L.

IMPORTANT : Ce site a été initialement créé pour la flore du département des Hautes-Alpes, faisant partie de la Région PACA. Les statuts de protection, réglementation et sauvegarde des Hautes-Alpes sont donc traités à part. La rubrique "Autres statuts" traite du reste de la France. Attention les textes peuvent être modifiés et le site FloreAlpes n'est en rien contractuel dans le domaine de la protection des espèces végétales !

Description

Description de Coste

1708 *Asperula arvensis* L.

- Plante annuelle de 20-40 cm, glabrescente, à racine grêle
- tige grêle, obtusément quadrangulaire, dressée, un peu scabre, rameuse dans le haut
- feuilles inférieures verticillées par 4, obovales, les autres verticillées par 6-8, linéaires, obtuses, longues de 1-3 cm, à 1 nervure, ciliées-scabres aux bords
- fleurs bleues, petites, inodores, en têtes terminales dépassées par un involucre de bractées foliacées, linéaires, bordées de longs poils blancs
- corolle à tube grêle un peu plus long que le limbe
- fruits glabres et lisses à la maturité.

Écologie Moissons et champs cultivés, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Avril-juin.

Illustrations



[Voir +/Compléter](#)

Répartition

Observations



Nomenclature

Taxons supérieurs

Ordre : Gentianales

Famille : Rubiaceae

Genre : Asperula

Nom retenu

☒ *Asperula arvensis* L.

Synonymes

☒ *Asperula caerulea* Bubani

☒ *Asperula ciliata* Moench

- 3) **Liparis de Loesel** (*Liparis loeselii* L ;) est une orchidée terrestre européenne se développant dans les prés tourbeux et des bas-marais calcicoles. Elle est très menacée en France et en forte régression dans toute l'Europe. Elle fait l'objet d'un plan national d'actions en France



Liparis de Loesel



Hampe florale en macrophotographie

Taxons supérieurs

Ordre : Asparagales

Famille : Orchidaceae

Genre : Liparis

Nom retenu

☑ ***Liparis loeselii* (L.) Rich.**

☑ Basionyme : *Ophrys loeselii* L.

Synonymes

Leptorkis loeselii (L.) MacMill.

☑ *Malaxis loeselii* (L.) Sw.

☑ *Ophrys liliiflora* L.

et 7 autres synonymes

Taxons inférieurs

Variété : *Liparis loeselii* var. *loeselii*

Variété : *Liparis loeselii* var. *ovata*

Johan N , Texel, the Netherlands 2006

Description de Coste

3620 *Malaxis loeselii*

Synonymes LIPARIS LOESELII Rich., STURMIA LOESELII Reich.

- Plante vivace de 8-20 cm, glabre, à, souche munie de 2 bulbes juxtaposés, contigus, l'ancien plus grand et latéral, terminés par des fibres radicales
- tige triquètre dans le haut, engainée intérieurement par 2 feuilles assez grandes, oblongues-lancéolées, vert jaunâtre
- fleurs vert jaunâtre, petites, 2-8 en épi court et lâche
- bractées triangulaires, plus courtes que le pédicelle
- labelle oblong-obtus, aussi long et bien plus large que les autres divisions linéaires
- gynostème allongé, bossu sur le dos
- anthère caduque, terminée en appendice membraneux
- pollinies à lobes parallèles et à 2 rétinacles.

Écologie Marais et prés tourbeux, çà et là dans le Nord, l'Est et l'Ouest.

Répartition Europe centrale et boréale ; Amérique boréale.

Floraison Juin-août.



Voir +/Compléter

Répartition

Observations



4) *Leonurus cardiaca* L.

Description	Illustrations
Description de Coste 2913 <i>Leonurus cardiaca</i> L. Cardiaque - Plante <u>vivace</u> d'environ 1 mètre, <u>pubescente</u>, robuste, <u>rameuse</u> - <u>feuilles</u> inférieures grandes, <u>palmatipartites</u>, à 5-7 lobes <u>lancéolés</u>, <u>incisés dentés</u>, les supérieures <u>lancéolées</u> et <u>bi-trifides</u> - <u>fleurs</u> <u>purpurines</u> assez grandes, en <u>verticilles</u> sensiblement plus courts que les <u>pétiotes</u> - <u>calice</u> à 5 angles, à dents à peine plus courtes que le <u>tube</u>, les 2 inférieures <u>réfléchies</u> - <u>corolle</u> <u>velue-laineuse</u> en dehors, 1 fois plus longue que le <u>calice</u>, à <u>tube</u> égalant le <u>calice</u>, muni en dedans d'un anneau de poils oblique - <u>carpelles</u> <u>hispides</u> au sommet. Écologie Haies, décombres, çà et là dans presque toute la France. Répartition Europe ; Asie ; Algérie ; introduit en Amérique. Floraison Juin-septembre.	 Voir +/Compléter
Nomenclature	Répartition
Taxons supérieurs Ordre : Lamiales Famille : Lamiaceae Genre : <i>Leonurus</i> Nom retenu ▣ <i>Leonurus cardiaca</i> L. Synonymes ▣ <i>Cardiaca stachys</i> Medik. ▣ <i>Cardiaca trilobata</i> Lam. ▣ <i>Cardiaca vulgaris</i> Moench	Observations 

L'**agripaume** ou agripaume cardiaque (*Leonurus cardiaca*) est une plante vivace de la famille des *Lamiaceae*, présente dans toute l'Europe, sauf en Méditerranée, de 0,50 à 1,20 m, dont on utilise les feuilles et les fleurs.

La tige est raide, à section carrée, très ramifiée et feuillée. Les feuilles sont vert foncé dessus et cendré dessous. Les fleurs sont rose pourpré, serrées sur toute la longueur de la tige.

L'agripaume est utilisée comme antispasmodique dans les troubles nerveux et les palpitations, ainsi que dans le traitement des diarrhées, bronchites et ballonnements¹. Il semble qu'on ait cru longtemps qu'elle pouvait calmer les douleurs de l'accouchement. Selon ses origines, elle était cultivée comme plante médicinale pour guérir la rag

5) *Centaurea maculosa* Lamk. Asteraceae

Description

Description de Coste

2084 *Centaurea maculosa* Lamk.

- Plante bisannuelle entièrement d'un vert blanchâtre
- tige à
- e 25-70 cm, rameuse
- feuilles inférieures bipennatiséquées, les supérieures pennatiséquées, à segments très étroits, linéaires
- capitules en panicule corymbiforme, étalée
- involucre ovoïde large de 7-9 mm, arrondi, non atténué à la base, à folioles fortement nervées sur le dos, à appendice d'un brun noir avec les cils plus pâles, argentés au moins au sommet, à pointe terminale plus courte
- akènes longs de 3 mm environ, à aigrette égalant du tiers à la moitié de leur longueur
- fleurs roses, les extérieures rayonnantes.

Écologie Rochers, côteaux, sables des rivières : Alsace, Lyonnais, Forez, Centre et Plateau central, Cévennes, tout le Midi, sauf la région méditerranéenne ; entraîné sur les grèves de la Loire jusqu'en Loir-et-Cher et même en Touraine.

Répartition Suisse, Italie, Europe centrale.

Floraison Juillet.

Illustrations



[Voir +/Compléter](#)

Répartition

Observations

Centaurea maculosa Lam.
[1785] - [carte des observations](#)

Répartition départementale



Taxons supérieurs

Ordre : Asterales

Famille : Asteraceae

Genre : Centaurea

Nom retenu

☒ ***Centaurea maculosa* Lam.**

☒ Basionyme : *Centaurea maculosa* Lam.

Synonymes

☒ *Acosta maculosa* (Lam.) Holub

☒ *Centaurea paniculata* subsp. *maculosa* (Lam.) Briq.

☒ *Centaurea stoebe* subsp. *maculosa* (Lam.) Schinz & Thell.

et 2 autres synonymes

Taxons inférieurs

Sous-Espèce : *Centaurea maculosa* subsp. *albida*

Sous-Espèce : *Centaurea maculosa* subsp. *maculosa*

Sous-Espèce : *Centaurea maculosa* subsp. *subalbida*