

☆ Plante ayant des fleurs; on y trouve des étamines, un pistil ou les deux à la fois.

☆ Plantes sans fleurs, n'ayant jamais ni étamines, ni pistil.


Section A : PLANTES A PÉTALES SÉPARÉS. —

☆ Fleur ayant plus de 12 étamines

☆ Fleur ayant 12 étamines ou moins de 12 étamines

★ Calice à sépales à la fois complètement séparés entre eux ou un peu soudés à la base et non soudés à l'ovaire [exemples : I, H, fleurs coupées en long par la moitié, S, AR].

★ Calice à sépales soudés plus ou moins longuement entre eux [exemples : N, SV, NF] — ou bien calice soudé à l'ovaire qui se trouve placé ainsi en apparence au-dessous de la fleur [exemples : A, G, C, E, fleurs coupées en long par la moitié].




⊕ Pétales libres entre eux, jusqu'à leur base

⊕ Pétales soudés entre eux, au moins à la base.

• Corolle non papilionacée.

• Corolle papilionacée (fig. P, A, DE, CI) [c'est-à-dire irrégulière avec un pétale supérieur e (écarté), deux pétala de côté a, a, (ailes), et deux pétala inférieurs soudés ce (carène)].



□ Arbre ou arbuste résineux, à fleurs sans stigmate.

□ Plante herbacée ou arbre ou arbuste non résineux; fleurs à stigmates.

— Feuilles à nervures non ramifiées [regarder par transparence] et parties semblables de la fleur disposées par 6 ou 3, ou moins de 3

— Plante n'ayant pas à la fois ces caractères; en général, feuilles à nervures plus ou moins ramifiées.

Section A : Plantes à pétales séparés → p. x.

Section B : Plantes à pétales soudés entre eux → p. xv.

Section C : Plantes à corolle papilionacée → p. xviii.

Section II : Plantes gymnospermes → p. xxvi.

Section E : Plantes monocotylédones → p. xxiii.

Section D : Plante à une seule enveloppe florale → p. xviii.

Section G : Plantes à fleurs en capitule → p. xxvi.

Section F : Plantes t^{tes} sans étamines ou t^{tes} sans pistil → p. xxiv.

Section I : Plantes cryptogames → p. xxvii.

1^{er} GROUPE → p. xi.

△ Pistil à carpelles entièrement libres ou réunis seulement par le milieu.....2^e GROUPE → p. xii.

△ Pistil à carpelles soudés en un seul ovaire.....3^e GROUPE → p. xii.

= Feuilles épaisses et charnues.....4^e GROUPE → p. xiv.

= Feuilles n'étant pas à la fois épaisses et charnues.....5^e GROUPE → p. xiv.


• Arbre ou arbrisseau.....5^e GROUPE → p. xiv.

• Plante n'étant pas un arbre ou un arbrisseau.....6^e GROUPE → p. xiv.

TABEAU GÉNÉRAL

Section E: PLANTES MONOCOTYLEDONES. —

Flours très irrégulières ayant l'ovaire placé en apparence sous la fleur et semblant souvent être le pédoncule de la fleur; 1 seule étamine soudée au stigmaté ou 2 étamines [exemples: PA, F, EN, PV, MF, A.]



ORCHIDÉES, p. 307.

Flours régulières, ni vertes, ni membraneuses, colorées...
Flours vertes et membraneuses ou non vivement colorées...

21^e GROUPE → p. XXIII.

22^e GROUPE → p. XXIII.

21^e GROUPE :

✱ 1, 2, 3 ou 4 étamines, ou étamines nombreuses. {


Plante à 3 étamines dont les anthères sont tournées en dehors.
Plante à 2, 3, 4 ou nombreuses étamines dont les anthères sont tournées en dedans.
Plante piquante ou d'un seul verticille de feuilles ou 2 feuilles en haut de la tige.
Plante aquatique n'ayant ni l'un ni l'autre de ces caractères.

IRIDÉES, p. 303.

Liliacées, p. 292.

Hydrocharidées, p. 313.

✱ Ovaire soudé au calice [en apparence sous la fleur, exemples: PN, G, L, PA.]




AMARYLLIDÉES, p. 305.

✱ 6 étamines. {

3 sépales verts; 3 pétales colorés; plante aquatique.
Feuilles non développées quand les fleurs paraissent; fleur à très long tube.
Corolle à tube très long sortant d'un bulbe à 3 styles soudés sur une grande longueur V.
Plante n'ayant pas à la fois ces caractères.

ALISMACÉES, p. 290.

✱ Ovaire libre. {




COLCHICACÉES, p. 291.

✱ 8 ou 10 étamines; feuilles verticillées; fleurs verdâtres.

Plante aquatique à fleurs roses.

LILIACÉES, p. 292.


✱ 9 étamines; fleurs presque en ombelle BU.



BUTOMIFES, p. 290.

22^e GROUPE :

Flours jaunâtres en épi serré C, et feuilles de 1 à 2 c. de largeur.



Aroidées, p. 317.

Enveloppe florale à 6 parties (3 pétales et 3 sépales tous semblables).

Feuilles larges, obtuses; anthères s'ouvrant en travers; fleurs blanchâtres en inflorescence rameuse ALB; plante de 8-12 d.

Colchicacées, p. 291.

Flours vertes, blanchâtres ou jaunâtres non membraneuses.

Plante n'ayant pas ces caractères et dont l'inflorescence ne ressemble pas à la fig. 1.

Feuilles très allongées; anthères s'ouvrant en long.

Enveloppe florale à 6 divisions avec monome à 3 folioles; fleurs jaunes ou jaunâtres en grappe; fruit globuleux.

Onagrinées, p. 313.

Flours membraneuses; pistil à ovaire non divisé extérieurement.

Feuilles sans involucre [ex: TR, SC.]

JONCÉES, p. 319.

Plante sans tiges ni feuilles [exemples: T. M.]

Plantes ne croissant pas dans la mer.

LEMNACÉES, p. 317.

Plante ayant une tige et des feuilles.

Flours réunies en boules.

Typhacées, p. 318.

Flours non en boules.

Plante croissant dans la mer.

POTAMÉES, p. 314.

Plante ordinairement non nageante et à feuilles de la base ayant une longue gaine (→ Voir la suite à la page suivante).

Feuilles 3 à 6 fois plus longues que larges, opposées ou par 3.

NAIADÉES, p. 316.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

ZOSTÉRACÉES, p. 316.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.



Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Plante à 4 étamines.

Plante à 1 étamine.

Suite du 23^e groupe.

- ☐ Fleurs réunies en boules S ou en cylindres bruns A.   **TYPACÉES**, p. 318.
- ☐ Fleurs en épi serré dans une grande bractée en cornet [ex. : AR].  **Aroïdées**, p. 317.
- ☐ Fleur ni en boules ni en cylindres bruns, ni dans une grande bractée en cornet.
- ☐ Gaine de la feuille fendue en long. { ★ Fleurs en une seule masse avec une bractée presque piquante C..  **Cypéracées**, p. 323.
- ☐ Gaine de la feuille non fendue. { ★ Plante n'ayant pas ces caractères..... **GRAMINÉES**, p. 339.
- ☐ Anthères en forme d'x allongé G;  tige non à 3 angles.....
- ☐ Anthères non en forme d'x allongé C;  tige souvent à 3 angles, au moins sur une partie de sa longueur..... **CYPÉRACÉES**, p. 323.

Section F. PLANTES A FLEURS TOUTES SANS ÉTAMINES OU TOUTES SANS PISTIL. —

- ☐ Deux enveloppes florales (calice et corolle) de consistance et de couleur différentes..... **23^e GROUPE** → p. xxiv.
- ☐ Une seule enveloppe florale ou deux enveloppes florales semblables..... **24^e GROUPE** → p. xxv.
- ☐ Enveloppe florale réduite à une écaille, ou pas d'enveloppe florale..... **25^e GROUPE** → p. xxv.

23^e GROUPE :

- ☐ Pétales séparés les uns des autres jusqu'à la base.
- ☐ Fleurs en ombelles..... **Ombellifères**, p. 117.
- ☐ Fleurs non en ombelles.
- ☐ Feuilles entières. { • Arbre ou arbrisseau. { ☐ Feuilles opposées COR et fleurs en grappes.  **Coriariées**, p. 63.
- ☐ Feuilles complètement divisées..... **Rosacées**, p. 92.
- ☐ Feuilles à 3-5 lobes profonds; petit arbuste à fleurs jaunâtres et à fruits charnus rouges..... **Grossulariées**, p. 113.
- ☐ = Plante aquatique, herbacée..... **HYDROCHARIDÉES**, p. 313.
- ☐ = Plante non aquatique; petit arbrisseau..... **Empéirées**, p. 272.
- ☐ Pétales soudés entre eux.
- ☐ Feuilles alternes. { — Arbre à feuilles entières DI.  **ÉRÉNACÉES**, p. 210.
- ☐ Feuilles opposées; corolle blanche ou rosée..... **Cucurbitacées**, p. 107.
- ☐ Feuilles toutes à la base..... **Valérianiées**, p. 144.
- ☐ **Plantaginées**, p. 258.

GRAMINÉES (1).

✕ Plante ayant à la fois les feuilles très larges (au moins 6 c.); et les épis de deux sortes, les uns à fleurs staminées, les autres à fleurs pistillées. 1^{er} GROUPE → p. 341

✕ Plusieurs épis d'épillets réunis au même point ou presque au même point [exemples : A, D, SA, SS]. ... 2^e GROUPE → p. 341.

✕ Plante n'ayant pas les caractères précédents.


* Épillets sans pédoncules ou à pédoncules très courts [ex. : MO, VL, E, M, A, RE, P, PE, CA, O, OD, VI, PR, RA, COE].

○ Épillets attachés tous directement sur l'axe principal [ex. : MO, VL, E, M, A, RE, P, PE, CA].

○ Épillets attachés par groupes sur l'axe principal ou inflorescence composée de plusieurs épis [ex. : O, OD, VI, PR, RA, COE].

= Épillets se recouvrant très étroitement les uns les autres [ex. : MO, VL, E, M, A].

= Épillets ne se recouvrant pas très étroitement les uns les autres [ex. : RE, P, PE, CA].



3^e GROUPE → p. 341.

4^e GROUPE → p. 342.


Section A → p. 340.

* Épillets sur des pédoncules plus ou moins allongés, au moins ceux du bas de l'inflorescence. Section B → p. 340.

(1) Les fleurs des Graminées sont toujours groupées en petits épis que l'on nomme *épillets*. Les épillets sont à leur tour groupés en épis, ou en grappes plus ou moins rameuses. Un épillet qui contient plusieurs fleurs est, en général, constitué de la manière suivante (fig. N° 1). Sur la tige principale de l'inflorescence ou sur un rameau A, se trouve attaché le pédoncule de l'épillet P, qui porte à la base les deux bractées inférieures de l'épillet; ces deux bractées G et G s'appellent les *glumes*; elles ne portent pas de fleurs à leur aisselle. Au-dessus, insérées aussi sur l'axe Pa de l'épillet, se trouvent d'autres bractées I, I, qui n'ont pas généralement la même forme que les glumes; elles portent à leur aisselle des fleurs reconnaissables à leurs étamines ou à leurs stigmates plumeux; ce sont les *glumelles inférieures*; chaque fleur F est ainsi comprise entre une glumelle inférieure I et une autre bractée S partant de l'axe même de la fleur et qu'on nomme *glumelle supérieure*.


Un épillet peut ne contenir qu'une seule fleur (fig. N° 2) avec ou sans la trace d'une seconde fleur avortée a. Les lettres de la figure N° 2, correspondant à celles de la fig. N° 1, indiquent comment est constitué un tel épillet.

La feuille des Graminées présente ordinairement une petite *languette* membraneuse à la jonction du limbe et de la gaine (fig. CA). Cette languette est souvent importante à considérer pour la détermination.



□ Glumes égales ou presque égales entre elles.

△ Inflorescence entièrement velue-cotonneuse, compacte ou rameuse [ex. : IM, O, ER].



5^e GROUPE → p. 343.


△ Inflorescence non cotonneuse.

+ Épillets tous réunis en une seule masse compacte [ex. : PA, V, AA, COE].



6^e GROUPE → p. 343.


+ Épillets non tous réunis en une seule masse compacte [ex. : DI, O, SC].



7^e GROUPE → p. 344.

□ Glumes indigales.

Glumelles ayant une ou plusieurs arêtes ou épines [ne pas confondre avec les arêtes qui sont parfois attachées à la base même de la fleur]. [ex. : T, AO, V, ECH.]




8^e GROUPE → p. 344.


Glumelles sans arête, obtuses ou terminées par une pointe courte ou par deux petites pointes.

• Languette de la feuille remplacée par des poils..... 9^e GROUPE → p. 344.
• Languette de la feuille membraneuse..... 10^e GROUPE → p. 345.

○ Glumes longuement dépassées par l'ensemble des glumelles [ex. : C, AR, M].



= Glumelle à arête attachée tout à fait sur le dos [ex. : S, FV] ou un peu au-dessous du sommet [ex. : SE, C].



11^e GROUPE → p. 345.


= Glumelle à arête attachée exactement au sommet, ou sans arête.

⊕ Languette de la feuille remplacée par une ligne de poils [exemple : D].

..... 12 GROUPE → p. 345.

⊕ Languette de la feuille membraneuse non remplacée par une ligne de poils..... 13^e GROUPE → p. 345.

○ Glumes non dépassées ou à peine dépassées par l'ensemble des glumelles, ou rarement pas de glumes. [Exemple : CA, C, CS, LA, HM.]



(→ Voyez la suite à la page suivante).

10^e GROUPE :

- Épillets isolés les uns des autres et devenant presque perpendiculaires à l'axe ;
glumelle inférieure ayant de longs poils [exemple : CI].



→ Voyez 56. *Melica*, p. 364.


- Épillets tous tournés d'un même côté ; feuilles développées jusque sous l'inflorescence ;
gaines à feuilles presque sans poils.

★ Épillets à 5-11 fleurs ; glumes presque égales → Voyez 58. *Scleropoa*, p. 364.
★ Épillets à 3-5 fleurs ; glumes très inégales.....52. *SCLEROCHLOA* → p. 362.
SCHLEROCHLOA [1 esp.].

- Plante n'ayant pas les caractères précédents → Voyez 48. *Koeleria*, p. 360.

11^e GROUPE :

- △ Glumelle à arête attachée un peu au-dessous du sommet [ex. : C, S].



...67. *BROMUS* → p. 367.
BROME [15 esp.].

- △ Glumelle à arête attachée tout à fait sur le dos [ex. : FV, S, V].



...46. *TRISTETUM* → p. 360.
TRISTETE [4 esp.].

- + Glumes de moins de 4 mm. de longueur [exemple : FV] ; fruit sans poils.

- + Glumes de plus de 5 mm. de longueur.

- Glumelles à 2 dents au sommet [exemple : S] ;
glumes très inégales [ex. : PU] ; fruit velu.



...45. *AVENA* → p. 358.
AVOINE [11 esp.].

- Glumelles entières au sommet V ;
glumes peu inégales V, A.



...44. *VENTENATA* → p. 358.
VENTENATA [1 esp.].

12^e GROUPE :

- = Glumelle inférieure à trois dents DE, celle du milieu parfois prolongée en arête ;




- inflorescence verte ou verdâtre à épillets peu nombreux [ex. : DD].




...63. *DANTHONIA* → p. 364.
DANTHONIA [1 esp.].

- = Glumelle inférieure entière ; inflorescence souvent violacée, à épillets nombreux C, ER, PL.



...28. *PHRAGMITES* → p. 354.
PHRAGMITES [1 esp.].

- ⊖ Fleurs entourées de longs poils C ; plante de 1-2 m. à inflorescence en plumet.



...62. *MOLINIA* → p. 364.
MOLINIA [1 esp.].



- ⊖ Fleurs non entourées de longs poils.

- × Épillets à 1-3 fleurs développées M.



...54. *ERAGROSTIS* → p. 363.
ERAGROSTIS [2 esp.].


- × Épillets ordinairement à 4-20 fleurs [exemple : EP].



13^e GROUPE :


- ★ Glumelles terminées par une arête plus ou moins longue.

- ⊗ Épillets disposés en masses compactes ou en une grappe allongée, serrée.



- ⊗ Épillets tous semblables à 3-5 fleurs ; inflorescence rameuse D.

- Inflorescence devenant d'un jaune doré ; épillets à fleurs avortées avant 2 glumes à la base.....65. *LAMARCKIA* → p. 365.
LAMARCKIA [1 esp.].
• Inflorescence ne devenant pas d'un jaune doré ; épillets à fleurs avortées sans glumes à la base.64. *CYNOSURUS* → p. 365.
CYNOSURE [2 esp.].




...60. *DACTYLIS* → p. 364.
DACTYLE [1 esp.].



- ★ Glumelles sans arête (→ Voir la suite de l'analyse à la page suivante).

Suite du 13^e groupe :

□ Feuilles arrondies au sommet CA ;

épillets n'ayant chacun que deux fleurs. 49. **CATABROSA** → p. 361.
CATABROSA [1 esp.].

△ Épillets plus larges que longs B, ou presque aussi larges que longs MX, très écartés les uns des autres ; glumelles arrondies au sommet.

... 55. **BRIZA** → p. 363.
BRIZE [3 esp.].

+ Glumelles sans arête, arrondies sur le dos et arrondies ou comme coupées au sommet ; 2 glumes membraneuses et très inégales [exemples d'épillets : F, A].

... 50. **GLYCERIA** → p. 361.
GLYCERIE [7 esp.].



+ Glumelles arrondies sur le dos et très pointues ou munies d'une arête au sommet ; glumes inégales.

... 66. **FESTUCA** → p. 365.
FETUQUE [19 esp.].

[exemples : O, H, RU, AR, SCH.]



+ Glumelles à angle sur le dos et peu pointues, sans arêtes ; glumes peu inégales [exemples : A, PR, AL].

... 53. **POA** → p. 362.
PATURIN [13 esp.].14^e GROUPE :

* Glumelles ayant une arête de 3 à 30 c. de longueur.

+ Arête ayant généralement moins de 5 centimètres et attachée au sommet de la glumelle supérieure → Voyez 23. **An-**
dropogon, p. 353.+ Arête ayant de 5 à 30 centimètres et terminant la glumelle inférieure. 36. **STIPA** → p. 356.
STIPA [6 esp.].

* Plante de 5 à 10 décimètres ; glumelle à arête courbée en genou AR.

→ Voyez 29. **Calamagrostis**, p. 354.

* Plante de 1 à 4 mètres ; pas d'arête courbée en genou.

□ Languette de la feuille remplacée par un faisceau de poils → Voyez 25. **Erianthus**, p. 353.

□ Languette de la feuille courte, membraneuse ; glumelle inférieure à 2 pointes avec une courte arête au milieu ARU.

... 27. **ARUNDO** → p. 354.
ARUNDO [2 esp.].

△ Feuilles les plus larges de plus de 1 centimètre de largeur, en général ; épillets nombreux SO, violacés.

→ Voyez 34. **Sorghum**, p. 353.

△ Glumes ou glumelles non entourées de nombreux poils.

△ Feuilles les plus larges de moins de 1 centimètre de largeur, en général.

+ Épillets très rapprochés en inflorescence compacte, brillante → Voyez 33. **Gastridium**, p. 356.

+ Épillets n'ayant pas ces caractères.

+ Feuilles les plus longues de plus de 15 c. de longueur :

+ Feuilles les plus longues de moins de 12 c. de longueur ; inflorescence à rameaux également écartés de la tige DI.

... 38. **PIPTATHERUM** → p. 357.
PIPTATHERUM [3 esp.].... 61. **DIPLACHNE** → p. 364.
DIPLACHNE [1 esp.].

* Glumes ou glumelles non entourées de nombreux poils.

51. **SCHISMUS**. *SCHISMUS*. — (→ Voyez fig. SCH, p. 348). Feuilles étroites à longs poils; languette de la feuille remplacée par une rangée de poils; glumes membraneuses sur les bords. [Endroits incultes; fl. d'un vert mêlé de blanc; 6-20 c.; m.-jt.; a.]

52. **SCLEROCHLOA**. *SCLÉROCHLOA*. — Tiges feuillées jusqu'en haut, à feuilles supérieures dépassant même souvent les inflorescences; glumes très inégales, à bords membraneux. [Chemins, prés, murs; fl. d'un vert mêlé de blanc; 4-12 c.; m.-jt.; a.]

53. **POA**. *PATURIN*. —

△ Tige aplatie dans sa partie inférieure, presque à deux tranchants.....

△ Tige non très aplatie.


○ Languette des feuilles moyennes très courte ou presque avortée [exemple: P.]

○ Languette des feuilles moyennes plus ou moins allongée [exemple: T].....



Série 1

* Feuilles moyennes de 4 à 8 mm. de largeur en général; glumelles à 5 nervures saillantes allant jusqu'en haut.



(Parfois feuilles longuement en pointe, non en cuiller au sommet: *P. hybrida* Gaud.) [Bois, fl. vertes ou pourpres; 6-10 d.; j.-jt.; v.]



[Murs, champs, pâturages; fl. vertes ou violacées; 1-5 d.; j.-at.; v.]

* Feuilles moyennes de 1 à 3 mm. de largeur en général; glumelles à nervures peu marquées, disparaissant vers le haut


Série 2

□ Glumelles dont les nervures de côté sont sans poils.

— Feuilles supérieures à languettes bien développées; plante annuelle → Voyez *P. annua*, p. 363.
— Feuilles toutes à languette courte et déchirée; épillets 8 à 11 fois plus longs que larges → Voyez *Bromus inermis*, p. 367.
— Feuilles supérieures à languettes presque complètement avortées, tiges allongées N. [Bois; fl. verdâtres; 2-8 d.; m.-at.; v.]


□ Glumelles dont les nervures de côté sont palmées PRT, CÆ.

Glumelle inférieure à 5 nervures saillantes PRT;



[Prés, chemins, murs; fl. verdâtres ou violacées; 2-8 d.; m.-at.; v.]

Glumelle inférieure à nervures peu saillantes CÆ;




tige souterraine à rameaux rampants. [Prés, chemins, murs; fl. verdâtres ou violacées; 2-8 d.; m.-at.; v.]


tige souterraine sans rameaux rampants. [Pâturages, rochers; fl. mêlées de violet, de jaune, de blanc ou de vert; 1-4 d.; jt.-at.; v.]

Série 3

* Tige épaissie en bulbe à la base BU; languette de la feuille aiguë BL; fleurs étalées PB (souvent transformées en feuilles). [Prés, murs, endroits incultes; fl. verdâtres ou violacées; 1-5 d.; av.-jt.; v.] 98s, p. 395.



* Tiges très longuement rampantes; les rameaux sans fleurs, à feuilles rapprochées et étalées CN;



languette de la feuille non aiguë; tiges portant les fleurs sans feuilles dans leur partie supérieure. [Rochers; fl. mêlées de violet, de vert et de blanc; 1-3 d.; jt.-s.; v.]

Schismus marginatus P. B.

Schismus à m. rges.

Région méditerranéenne (très rare).

Sclerochloa dura P. B.

Sclerochloa dura.

Es., Sud-Est, Auvergne, Midi (rare). [S]

Série 1 → p. 362.

Série 2 → p. 362.

Série 3 → p. 362.

Poa sudetica Hænke.

Paturin de Silésie.

Montagnes, Nord-Est, Côte-d'Or.

Poa compressa L.

Paturin comprimé.

Assez commun. [S]

Poa nemoralis L.

Paturin des forêts.

Commun, sauf dans la plaine méditerranéenne. [S]

Poa pratensis L.

Paturin des prés.

Très commun. [S]

Poa caesia Sm.

Paturin bleu.

Alpes (Hautes régions). [S]

Poa bulbosa L.

Paturin bulbeux.

Commun. [S]

Poa distichophylla Gaud.

Paturin à feuilles distiques.

Alpes; Pyrénées (rare). [S]

* Plante n'ayant pas les caractères précédents (→ Voyez la suite de l'analyse à la page suivante).

Suite de l'analyse de la série 3 :


- ① Glumelles à 5 nervures saillantes TV;



feuilles les plus grandes ayant 4 à 5 mm. de largeur; inflorescence ayant souvent 8 à 15 c. de longueur.

[Endroits frais; fl. verdâtres ou violacées; 4-7 d.; m.-jt.; v.]

- ★ Languette de la feuille arrondie au sommet SR.



— Plante sans tiges souterraines développées A, ayant en général moins de 3 d.; glume inférieure à 1 seule nervure.
[Champs, rues, chemins; fl. verdâtres mêlées de blanc ou de violet; 5-20 c.; jv.-d.; a. ou b.]

— Plante à partie souterraine des tiges développées, ayant en général plus de 3 d.; glume inférieure à 3 nervures.

[Endroits humides; fl. verdâtres; 3-9 d.; j.-jt.; a.]

△ Épillets à 2-3 fleurs; glume inférieure à 8 nervures; inflorescence non étalée; feuilles peu raides.

[Pâturages, rochers; fl. d'un violet mêlé de vert et de blanc; 1-2 d.; jt.-s.; v.]

△ Glume inférieure à 1 seule nervure; épillets assez distants les uns des autres ML.

[Rochers, pâturages; fl. mêlées de vert et de violet; 1-2 d.; jt.-at.; v.]

△ Épillets à 4-6 fleurs.
△ Glume inférieure à 3 nervures; épillets plus ou moins serrés AL (Souvent fleurs transformées en feuilles). [Près, bois, rochers; fl. mêlées de vert et de violet; 1-4 d.; jt.-s.; v.]



Poa trivialis L.

Paturin commun.

Commun. [S]

Poa annua L.

Paturin annuel.

Très commun. [S]

Poa palustris Roth.

Paturin des marais.

Nord-Ouest, Ouest, Centre, Bresse

(rare). [S]

Poa laxa Henke.

Paturin à fleurs lâches.

Alpes, Pyrénées (Hautes régions). [S]

Poa minor Gaud.

Paturin petit.

Alpes (Hautes régions). [S]

Poa alpina L.

Paturin des Alpes.

Montagnes, Côte-d'Or. [S]

54 ERAGROSTIS. ERAGROSTIS. —

- ✕ Épillets à courts pédoncules ER;



rameaux de l'inflorescence non poilus à la base. (Parfois épillets de 1 mm. à 1 mm. 1/2 de largeur : *E. poaoides* P.B.)

[Champs, sables; bord des rivières; fl. vertes mêlées de violet; 1-3 d.; jt.-at.; a.]

- ✕ Épillets à longs pédoncules PL;



rameaux de l'inflorescence poilus à la base.

[Champs, sables; fl. pourpres souvent mêlées de vert; 2-4 d.; j.-jt.; a.]

55. BRIZA. BRIZA.

- == Épillets de 7 à 10 mm. de largeur, rejetés en général d'un même côté; ordinairement peu nombreux MX.

[Endroits incultes; fl. d'un blanc brillant ou roussâtres; 2-5 d.; m.-j.; a.]



Briza maxima L.

Briza grande.

Région méditerranéenne. [S] sub.

- ⊕ Languette de la feuille courte, obtuse MD;



feuilles, en général, de 2-4 mm. de largeur.

[Bois, prés, coteaux; fl. vertes ou pourpres; 2-6 d.; j.-at.; v.]


- == Épillets de 2 à 5 mm. de largeur; épillets très nombreux (ex. : ME).

- ⊕ Languette de la feuille allongée, plus ou moins aiguë MN;



feuilles en général, de 4 à 6 mm. de largeur.

[Champs, sables; fl. verdâtres ou pourpres; 1-3 d.; m.-j.; a.]



Briza media L.

Briza intermédiaire (Langue de femme).

Commun. [S]

Briza minor L.

Briza petite.

Midi et çà et là, sauf dans l'Est.

[S] sub.